



Inspectoratul Școlar Județean Timiș

Societatea de Științe Matematice din România

Olimpiada Națională de Matematică
Etapa Locală, județul Timiș
16.02.2024

Clasa a VIII-a
Barem de corectare și notare

1.a) Arătați că dacă $x \in [-1, 1]$, $y \in [-2, 2]$ și $z \in [-3, 3]$, atunci:

$$x^2 + y^2 + z^2 + xy - xz - yz \in [0, 25].$$

b) Fie $x \in \mathbb{R}$, $x > 1$. Demonstrați că $x^2 = ([x]^2 + 1)(\{x\}^2 + 1) \Leftrightarrow x = [x] + \frac{1}{[x]}$.

Soluție:

a) $x^2 + y^2 + z^2 + xy - xz - yz = \frac{1}{2}[(x+y)^2 + (y-z)^2 + (x-z)^2]$1p

$-3 \leq x+y \leq 3$, $-5 \leq y-z \leq 5$, $-4 \leq x-z \leq 4$, de unde rezultă:

$0 \leq (x+y)^2 \leq 9$, $0 \leq (y-z)^2 \leq 25$, $0 \leq (x-z)^2 \leq 16$2p

$0 \leq \frac{1}{2}[(x+y)^2 + (y-z)^2 + (x-z)^2] \leq 25$1p

b) Scriind $x = [x] + \{x\}$ obținem:

$x^2 = ([x]^2 + 1)(\{x\}^2 + 1) \Leftrightarrow ([x] + \{x\})^2 = [x]^2 \cdot \{x\}^2 + [x]^2 + \{x\}^2 + 1 \Leftrightarrow$1p

$\Leftrightarrow 2[x] \cdot \{x\} = [x]^2 \cdot \{x\}^2 + 1 \Leftrightarrow ([x] \cdot \{x\} - 1)^2 = 0 \Leftrightarrow [x] \cdot \{x\} = 1 \Leftrightarrow$1p

$\Leftrightarrow \{x\} = \frac{1}{[x]} \Leftrightarrow x - [x] = \frac{1}{[x]} \Leftrightarrow x = [x] + \frac{1}{[x]}$1p

2. a) Arătați că, oricare ar fi $n \in \mathbb{N}^*$, au loc inegalitățile: $\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} < \frac{1}{(n+2)\sqrt{n}} < \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+2}}$.

b) Arătați că: $\frac{1}{3} + \frac{1}{4\sqrt{2}} + \frac{1}{5\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{2024\sqrt{2022}} < 2$

Soluție:

a) $\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} < \frac{1}{(n+2)\sqrt{n}} \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{1}{n+2}\right) < \frac{1}{\sqrt{n+1}} \Leftrightarrow \frac{n+1}{n+2} < \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}} \Leftrightarrow$1p

$\Leftrightarrow (n+1)^3 < (n+2)^2 \cdot n \Leftrightarrow n^3 + 3n^2 + 3n + 1 < n^3 + 4n^2 + 4n \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow n^2 + n > 1$, adevărat $\forall n \in \mathbb{N}^*$1p

$\frac{1}{(n+2)\sqrt{n}} < \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+2}} \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{n+2}} < \frac{1}{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{1}{n+2}\right) \Leftrightarrow \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+2}} < \frac{n+1}{n+2} \Leftrightarrow$1p

$\Leftrightarrow n(n+2)^2 < (n+1)^2(n+2) \Leftrightarrow n^3 + 4n^2 + 4n < n^3 + 4n^2 + 5n + 2$,

adevărat $\forall n \in \mathbb{N}^*$1p

$$\frac{1}{3\sqrt{1}} < \frac{1}{\sqrt{1}} - \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{4\sqrt{2}} < \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{4}}, \frac{1}{5\sqrt{3}} < \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{5}}, \dots, \frac{1}{2024\sqrt{2022}} < \frac{1}{\sqrt{2022}} - \frac{1}{\sqrt{2024}} \dots 1p$$

Adunând relațiile obținem:

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{4\sqrt{2}} + \frac{1}{5\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{2024\sqrt{2022}} < \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{2022}} - \left(\frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{4}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{2024}} \right) \Rightarrow$$

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{4\sqrt{2}} + \frac{1}{5\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{2024\sqrt{2022}} < \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2023}} - \frac{1}{\sqrt{2024}} \dots 1p$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2023}} - \frac{1}{\sqrt{2024}} < 1, \text{ deci } \frac{1}{3} + \frac{1}{4\sqrt{2}} + \frac{1}{5\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{2024\sqrt{2022}} < 2 \dots 1p$$

3. Fie cubul $ABCD A' B' C' D'$. Pe muchiile BB' și CC' considerăm punctele M și N astfel încât suma $AM + MN + ND'$ să fie minimă. Calculați sinusul unghiului determinat de dreptele MN și AD' .
(G.M. Nr.10/2022, enunț modificat)

Soluție:

Suma $AM + MN + ND'$ este minimă atunci când punctele A, M, N, D' sunt coliniare pe desfășurarea în plan a suprafeței laterale a cubului.....1p

$$BM = NC' = \frac{BB'}{3} \dots 1p$$

$$\text{Fie } BP \parallel MN, P \in CC'. \text{ Atunci } CP = \frac{CC'}{3} \dots 1p$$

$$\text{Din } BC' \parallel AD' \text{ și } BP \parallel MN \text{ rezultă } \sphericalangle(AD', MN) = \sphericalangle(BC', BP) = \sphericalangle(PBC') \dots 1p$$

$$A_{PBC'} = \frac{BC \cdot PC'}{2}, A_{PBC'} = \frac{PB \cdot BC' \cdot \sin \sphericalangle(PBC')}{2} \Rightarrow \sin \sphericalangle(PBC') = \frac{PC' \cdot BC}{PB \cdot BC'} \dots 1p$$

$$\text{Dacă } BC = x \Rightarrow PC' = \frac{2}{3}x, PB = \frac{x\sqrt{10}}{3}, BC' = x\sqrt{2} \Rightarrow \sin \sphericalangle(PBC') = \frac{\sqrt{5}}{5} \dots 2p$$

4. Triunghiurile ACD și BCD sunt situate în plane diferite. Fie G_1 centrul de greutate al triunghiului ACD și G_2 centrul de greutate al triunghiului BCD . Știind că N este mijlocul segmentului $[CD]$, $M \in [AB]$ astfel încât $\frac{AM}{AB} = \frac{2}{5}$, iar $MN \cap AG_2 = \{E\}$, demonstrați că $EG_1 \parallel (BCD)$.

Soluție:

$$G_1 - \text{centrul de greutate al triunghiului } ACD \Rightarrow \frac{AG_1}{G_1N} = 2,$$

$$G_2 - \text{centrul de greutate al triunghiului } BCD \Rightarrow \frac{BG_2}{G_2N} = 2,$$

$$\text{În } \triangle ANB, \frac{AG_1}{G_1N} = \frac{BG_2}{G_2N} \Rightarrow G_1G_2 \parallel AB \dots 2p$$

$$\text{Fie } MN \cap G_1G_2 = \{P\};$$

$$\text{În } \triangle BMN, G_2P \parallel BM \Rightarrow \triangle NPG_2 \sim \triangle NMB \Rightarrow \frac{PG_2}{BM} = \frac{NG_2}{NB} = \frac{1}{3} \Rightarrow PG_2 = \frac{BM}{3} = \frac{1}{3}(AB - AM) =$$

$$\frac{1}{3}\left(AB - \frac{2}{5}AB\right) = \frac{1}{5}AB \dots 2p$$

$$PG_2 \parallel AM \Rightarrow \triangle EPG_2 \sim \triangle EMA \Rightarrow \frac{EG_2}{EA} = \frac{PG_2}{AM} \Rightarrow \frac{EG_2}{EA} = \frac{\frac{1}{5}AB}{\frac{2}{5}AB} = \frac{1}{2} \dots 1p$$



G_1 –centru de greutate în triunghiul ADC $\Rightarrow \frac{G_1N}{AG_1} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{EG_2}{EA} = \frac{G_1N}{G_1A} \Rightarrow EG_1 \parallel NG_2$1p
 $NG_2 \subset (BCD), G_1 \notin (BCD) \Rightarrow EG_1 \parallel (BCD)$1p