



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN TIMIȘ
Str. Dr. Liviu Gabor nr. 1, 300004, Timișoara,
Tel +40 (0)256 305799, Fax2mail +40 (0)371 627683
registratura@isjtm.ro, www.isj.tm.edu.ro
Operator de date cu caracter personal nr.18818



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII

Inspectoratul Școlar Județean Timiș

Societatea de Științe Matematice din România

Olimpiada Națională de Matematică

Etapa Locală, județul Timiș

5.02.2026

Clasa a XI-a MI

(30 p) 1. Se consideră matricea $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_4(\mathbb{R})$.

Să se calculeze A^n și determinantul matricei A^n , $n \in \mathbb{N}^*$.

(20p) 2. Să se calculeze $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{C_n^1 + \frac{1}{2}C_n^2 + \dots + \frac{1}{n}C_n^n}{2^2 + \frac{1}{2}2^3 + \dots + \frac{1}{n}2^{n+1}}$.

(20p) 3. Se consideră șirul $(x_n)_{n \geq 1}$ de numere reale definit prin $x_1 = \sqrt{\frac{1}{2}}$, $x_{n+1} = \sqrt{\frac{1+x_n}{2}}$, $n \geq 1$.

Să se calculeze $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n)$.

(20p) 4. Pentru fiecare $n \in \mathbb{N}$ considerăm numerele $a_n, b_n \in \mathbb{N}$ astfel încât $(2 + \sqrt{3})^n = a_n + b_n\sqrt{3}$.

a) Arătați că $(2 - \sqrt{3})^n = a_n - b_n\sqrt{3}$, pentru orice $n \in \mathbb{N}$.

b) Determinați $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$.

NOTĂ: Toate subiectele sunt obligatorii.

Timpul de lucru este de trei ore.

Se acordă 10 puncte din oficiu.

Succes!