



OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ

ETAPA LOCALĂ – 8 FEBRUARIE 2026

CLASA A VI-a

Soluții și bareme de corectare

SUBIECTUL I (40 de puncte)

Subiect	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Răspuns corect	D	B	C	E	E	C	A	E	C	D
	4p	4p	4p	4p	4p	4p	4p	4p	4p	4p

SUBIECTUL II (25 de puncte)

Unghiurile $\angle P_1OP_2, \angle P_2OP_3, \angle P_3OP_4, \dots, \angle P_8OP_9$ au interioarele disjuncte, iar $\angle P_1OP_9$ este alungit. Dacă $\angle P_1OP_2 = n_1^\circ, \angle P_2OP_3 = n_2^\circ, \dots, \angle P_8OP_9 = n_8^\circ$, unde $n_1, n_2, n_3, \dots, n_8$ sunt numere naturale prime distincte de două cifre și $n_1 > n_8 > n_7 > n_2 > n_3 > n_6 > n_5 > n_4$, atunci arătați că:

- $OP_5 \perp OP_1$
- semidreapta (OP_5 este bisectoarea unghiului $\angle P_3OP_7$;
- $\angle P_1OP_3 = \angle P_3OP_7 = \angle P_7OP_9$.

Soluție.

- Cum $\angle P_1OP_9 = \angle P_1OP_2 + \angle P_2OP_3 + \dots + \angle P_8OP_9$ și $\angle P_1OP_9$ este unghi alungit, rezultă că
 $n_1 + n_2 + n_3 + \dots + n_8 = 180$ 2p
Suma celor mai mici 8 numere prime de două cifre este $11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29 + 31 + 37 = 180$, deci
 $n_1, n_2, n_3, \dots, n_8$ sunt chiar 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 (nu neapărat în această ordine) 4p
Cum $n_1 > n_8 > n_7 > n_2 > n_3 > n_6 > n_5 > n_4$, deducem că $n_1 = 37, n_2 = 23, n_3 = 19, n_4 = 11, n_5 = 13, n_6 = 17,$
 $n_7 = 29$ și $n_8 = 31$ 3p
Atunci $\angle P_1OP_5 = \angle P_1OP_2 + \angle P_2OP_3 + \angle P_3OP_4 + \angle P_4OP_5 = 37^\circ + 23^\circ + 19^\circ + 11^\circ = 90^\circ$, deci $OP_5 \perp OP_1$ 2p
- $\angle P_3OP_5 = \angle P_3OP_4 + \angle P_4OP_5 = 19^\circ + 11^\circ = 30^\circ$ 2p
 $\angle P_5OP_7 = \angle P_5OP_6 + \angle P_6OP_7 = 13^\circ + 17^\circ = 30^\circ$ 2p
Cum $\angle P_3OP_5 = \angle P_5OP_7$, rezultă că semidreapta OP_5 este bisectoarea unghiului $\angle P_3OP_7$ 2p
- $\angle P_1OP_3 = \angle P_1OP_2 + \angle P_2OP_3 = 37^\circ + 23^\circ = 60^\circ$ 2p
 $\angle P_3OP_7 = \angle P_3OP_4 + \angle P_4OP_5 + \angle P_5OP_6 + \angle P_6OP_7 = 19^\circ + 11^\circ + 13^\circ + 17^\circ = 60^\circ$ 2p
 $\angle P_7OP_9 = \angle P_7OP_8 + \angle P_8OP_9 = 29^\circ + 31^\circ = 60^\circ$ 2p
Așadar, $\angle P_1OP_3 = \angle P_3OP_7 = \angle P_7OP_9 = 60^\circ$ 2p

SUBIECTUL III (25 de puncte)

Determinați numărul minim și numărul maxim de divizori ai numărului $\overline{abcabc}$, știind că $\overline{abc}$ este pătrat perfect.

Supliment Gazeta Matematică nr. 10 / 2025

Soluție. Vom folosi faptul că dacă numărul natural x admite descompunerea în factori primi $x = p_1^{k_1} \cdot p_2^{k_2} \cdot \dots \cdot p_n^{k_n}$, unde $p_1, p_2, \dots, p_n$ sunt numere prime distincte două câte două, atunci numărul divizorilor lui x este egal cu $(k_1 + 1) \cdot (k_2 + 1) \cdot \dots \cdot (k_n + 1)$.

Fie $n = \overline{abcabc} = \overline{abc} \cdot 1001 = \overline{abc} \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$ **3p**

$\overline{abc}$ este pătrat perfect și $10^2 = 100 \leq \overline{abc} \leq 999 < 1024 = 32^2$, deci $\overline{abc} \in \{10^2, 11^2, 12^2, \dots, 31^2\}$ **4p**

Dacă $\overline{abc} = p^2$, unde p este număr prim, $p \neq 11$, $p \neq 13$, atunci $n = p^2 \cdot 7^1 \cdot 11^1 \cdot 13^1$, deci n are $(2+1) \cdot (2+1) \cdot (1+1) \cdot (1+1) = 3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 24$ de divizori **4p**

Dacă $p = 11$ sau $p = 13$, atunci $n = 7^1 \cdot 13^1 \cdot 11^3$ sau $n = 7^1 \cdot 11^1 \cdot 13^3$, iar în fiecare dintre aceste cazuri n are $(1+1) \cdot (1+1) \cdot (3+1) = 2 \cdot 2 \cdot 4 = 16$ divizori **4p**

Dacă $\overline{abc} = q^2$, unde q este număr compus, atunci $10 \leq q \leq 30$. Cum $2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$, rezultă că q are trei divizori primi distincți doar dacă $q = 30$, iar dacă $q < 30$, atunci q are cel mult doi divizori primi distincți. În plus, cum $7^2 > q$, cel mult unul dintre factorii primi 7, 11, 13 apare în descompunerea lui q , și doar la puterea 1.

Ca urmare, este necesar să analizăm trei cazuri, în funcție de formele pe care le poate avea q :

- Dacă $q = 2 \cdot 3 \cdot 5$, atunci $n = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$, deci n are $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 216$ divizori
 - Dacă $q = c \cdot a^x$, unde a este prim, diferit de 7, 11, 13, iar $c \in \{7, 11, 13\}$, atunci $n = a^{2x} \cdot c^3 \cdot d \cdot e$, unde $\{c, d, e\} = \{7, 11, 13\}$, deci n are $16 \cdot (2x+1)$ divizori.
 - Dacă $q = a^x \cdot b^y$, unde $a, b \notin \{7, 11, 13\}$ sunt prime distincte, atunci $n = a^{2x} \cdot b^{2y} \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$, deci n are $8 \cdot (2x+1)(2y+1)$ divizori.
- **6p**

Presupunând că n ar putea avea mai mult de 216 divizori, ar rezulta că are loc una dintre relațiile:

- $16 \cdot (2x+1) > 216$, de unde $x \geq 7$, deci $q \geq 2^7 \cdot c = 128 \cdot c > 30$, imposibil
- $8 \cdot (2x+1)(2y+1) > 216$, adică $(2x+1)(2y+1) > 27$, deci cel puțin unul dintre numerele (impare) $2x+1$ și $2y+1$ trebuie să fie cel puțin egal cu 7, altfel am avea $27 < (2x+1)(2y+1) \leq 5 \cdot 5 = 25$, fals. Dacă de exemplu, $2x+1 \geq 7$, atunci $x \geq 3$, iar singurul număr q între 12 și 30 divizibil cu un cub perfect este $24 = 2^3 \cdot 3$, care nu îndeplinește condiția $(2x+1)(2y+1) > 27$ (avem $x=3, y=1$)

În concluzie, numărul minim de divizori ai lui n este 16, iar numărul maxim de divizori este 216 **4p**