

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ

ETAPA LOCALĂ – 8 FEBRUARIE 2026

CLASA A XII-a

Soluții și bareme de corectare

SUBIECTUL I (40 de puncte)

Subiect	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Răspuns corect	B	B	A	B	E	C	D	C	C	B
	4p	4p	4p	4p	4p	4p	4p	4p	4p	4p

SUBIECTUL II (25 de puncte)

Determinați $a \in \mathbb{R}$ astfel încât mulțimea $A = [a, +\infty)$ să fie parte stabilă a lui $\mathbb{R}$ în raport cu legea de compoziție:

$$x \circ y = xy + x + y, \text{ pentru orice } x, y \in \mathbb{R}.$$

Supliment Gazeta Matematică nr. 9 / 2025

Soluție.

Cum A este parte stabilă și $a \in A$, rezultă că $a \circ a \in A \Leftrightarrow a^2 + 2a \geq a \Leftrightarrow a^2 + a \geq 0 \Leftrightarrow a \in (-\infty, -1] \cup [0, \infty)$.

Așadar, dacă A este parte stabilă, este necesar (dar nu neapărat și suficient) ca $a \in (-\infty, -1] \cup [0, \infty)$ **6p**

Vom verifica pentru ce valori $a \in (-\infty, -1] \cup [0, \infty)$, mulțimea $A = [a, \infty)$ este într-adevăr parte stabilă a mulțimii $\mathbb{R}$ în raport cu legea de compoziție „ $\circ$ ”.

Dacă $a \geq 0$, este evident că pentru orice $x, y \geq a \geq 0$, avem $x \circ y = xy + x + y \geq a^2 + 2a \geq a$, deci $x \circ y \in A$.

Ca urmare, pentru orice $a \geq 0$, mulțimea A este parte stabilă a lui $\mathbb{R}$ în raport cu legea „ $\circ$ ” **6p**

Dacă $a = -1$, atunci $A = [-1, \infty)$ și $x \circ y = xy + x + y = (x+1)(y+1) - 1 \geq -1$, pentru orice $x, y \geq -1$, deci

$x \circ y \in A$, adică A este parte stabilă a lui $\mathbb{R}$ în raport cu legea „ $\circ$ ” și pentru $a = -1$ **6p**

Dacă $a < -1$, atunci avem $a \in A$ și $1 \in A$, dar $a \circ 1 = 2a + 1 = a + (a+1) < a$, deoarece $a+1 < 0$, deci $a \circ 1 \notin A$.

Ca urmare, pentru $a \in (-\infty, -1)$, mulțimea A nu este parte stabilă a lui $\mathbb{R}$ în raport cu legea „ $\circ$ ” **6p**

În concluzie, mulțimea $A = [a, \infty)$ este parte stabilă a mulțimii $\mathbb{R}$ în raport cu legea de compoziție „ $\circ$ ” dacă și numai dacă $a \in \{-1\} \cup [0, \infty)$ **1p**

SUBIECTUL III (25 de puncte)

Fie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție derivabilă, cu derivata continuă, și $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. Calculați limitele:

a) $L_1 = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_a^b (f(x+h) - f(x)) dx$;

b) $L_2 = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} \int_a^b (f(x+2h) - 2f(x+h) + f(x)) dx$.

Soluție. a) Cum f este continuă, rezultă că f admite primitive. Considerând o primitivă F a lui f , rezultă că:

$$\begin{aligned} \int_a^b (f(x+h) - f(x)) dx &= \int_a^b f(x+h) \cdot (x+h)' dx - \int_a^b f(x) dx = F(x+h) \Big|_a^b - F(x) \Big|_a^b = \\ &= F(b+h) - F(a+h) - F(b) + F(a) = (F(b+h) - F(b)) - (F(a+h) - F(a)) \end{aligned}$$

10p

Obținem:

$$L_1 = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_a^b (f(x+h) - f(x)) dx = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{F(b+h) - F(b)}{h} - \frac{F(a+h) - F(a)}{h} \right) = F'(b) - F'(a) = f(b) - f(a)$$

5p

b) Ca la punctul anterior, deducem că:

$$\int_a^b (f(x+2h) - 2f(x+h) + f(x)) dx = (F(b+2h) - 2F(b+h) + F(b)) - (F(a+2h) - 2F(a+h) + F(a)), \text{ deci}$$

$$L_2 = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{F(b+2h) - 2F(b+h) + F(b)}{h^2} - \frac{F(a+2h) - 2F(a+h) + F(a)}{h^2} \right) \dots\dots\dots 5p$$

Ținând cont de continuitatea funcțiilor F, f și f' , și folosind regula lui L'Hôpital, cazul $\left[\frac{0}{0} \right]$, avem:

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(b+2h) - 2F(b+h) + F(b)}{h^2} &\stackrel{L'H}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F'(b+2h) \cdot (b+2h)' - 2F'(b+h) \cdot (b+h)'}{2h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(b+2h) - f(b+h)}{h} \stackrel{L'H}{=} \lim_{h \rightarrow 0} (2f'(b+2h) - f'(b+h)) = f'(b) \end{aligned}$$

și analog, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(a+2h) - 2F(a+h) + F(a)}{h^2} = f'(a)$, deci $L_2 = f'(b) - f'(a) \dots\dots\dots 5p$